

- Die Lagerzeiten von Arzneimitteln sind zu beachten
- Beachtung der vorgeschriebene Kühl Lagerung (Kühlschrank)
 - Verwendung eines Min/ Max- Thermometers
 - Pflicht der täglichen Kontrolle der Temperatur sowie Dokumentation
- Medikamente und Lebensmittel dürfen nicht im gleichen Kühlschrank gelagert werden.
- Vor Aufziehen von Medikamenten sind die Arbeitsflächen zuvor zu desinfizieren sowie eine hygienische Händedesinfektion vorzunehmen.
- Bei Verwendung von Mehrdosisbehältnissen sind hierauf Anbruchdatum zu vermerken und die Herstellerangaben zu beachten.
- Mehrdosisbehältnisse ohne Konservierungsmittel (z.B. Aqua dest, NaCl, Na- Citrat oder Na- Oxalat) sind nur für den kurzfristigen Gebrauch zulässig. Spülösungen sind nach Anbruch 24h verwendbar.
- Angebrochene Mehrdosisbehälter mit Konservierungsmittel sind spätestens nach einem Monat zu verwerfen.
- Gummimembran der Mehrdosisbehälter muss vor erneuter Entnahme wischdesinfiziert werden
- Kanülen dürfen nicht in der Membran belassen werden
- zum Aufziehen jeweils unbenutzte, sterile Kanülen und Spritzen verwenden
- Aufgezogene Medikamente müssen mit Datum + Uhrzeit gekennzeichnet und mit einem sterilen Stöpsel verschlossen werden
- Aufgezogene Spritzen sind unverzüglich zu applizieren. Müssen situationsbedingt mehrere Spritzen gleichzeitig vorbereitet werden, sollte die Lagerfrist 15 Minuten nicht überschreiten.

Mitgeltende Dokumente / Unterlagen:

- Hygieneplan
- Hygieneplan- OP
- Kühlschrankkontrolle